Acatísia

36 llengües

Contingut amaga

Inici
Etiologia
Antipsicòtics
Antidepressius
Antiemètics
Dèficit de ferro
Simptomatologia
Referències
Vegeu també

L'**acatísia**, en medicina, és un trastorn del moviment que consisteix en un sentiment d'inquietud i la necessitat de moure's constantment.[1] És un conjunt de sentiments i pensament d'intranquilitat, neguit, entre d'altres. Les persones amb aquest trastorn no són capaces d'estar assegudes, sempre tenen la necessitat de moure una part del seu cos. Generalment, creuar i descreuar les cames, aixecar-se i asseure-se, balancejar-se, entre d'altres.

Acatísia	
Tipus	agitació psicomotriu
Especialitat	neurologia
Classificació	
CIM-11	8A07.1
CIM-10	G21.1 i 333.99
CIM-9	781.0 i 333.99
Recursos externs	
DiseasesDB	32479
eMedicine	1151826 i 815881

Etiologia [modifica]

L'acatísia forma part dels efectes adversos de fàrmacs, utilitzats en el tractament de patologia neurològica, com poden ser els neurolèptics i antipsicòtics. Tot i així, hi ha altres fàrmacs que també poden desencadenar aquest trastorn.[2]

Antipsicòtics [modifica]

Els antipsicòtics són els principals fàrmacs que desencadenen acatísia. Alguns d'ells són: haloperidol, clorpromazina, droperidol, entre d'altres.[3]

Antidepressius [modifica]

Els antidepressius també poden desencadenar acatísia. Per exemple, la trazadona, la venlafaxina i els antidepressius tricíclics. [3]

Antiemètics [modifica]

Els antiemètics amb mecanisme d'acció bloquejador de dopamina també poden provocar el trastorn d'acatísia. Alguns d'aquests són: metoclopramida, prometazina, proclorperazina, entre d'altres.[3]

Dèficit de ferro [modifica]

La disminució de ferro a l'organisme pot desencadenar trastorns com l'acatísia, fibromiàlgia, cames inquietes, entre d'altres.[3]

Simptomatologia [modifica]

Aquest trastorn psicomotriu té associats diferents símptomes, a part de la necessitat constant de moure's, que provoquen un malestar general de la persona. Alguns d'aquests símptomes són: rigidesa muscular, cansament, dolor neuropàtic, hipertensió arterial, hiperactivitat, taquipnea, distonia, contraccions musculars, trastorns de conducta, depressió, tendències suïcides, entre d'altres.[4]

Referències [modifica]

1. ↑ «Síndrome de piernas inquietas» (en castellà). ClínicaDam. [Consulta: 6 abril 2015].
2. ↑ «Benzodiazepines for neuroleptic-induced acute akathisia» (en anglès). Cochrane. [Consulta: 6 abril 2015].
3. ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 «Causes de la acatisia» (en castellà). acatisia.org. Arxivat de l'original el 2018-10-14. [Consulta: 6 abril 2015].
4. ↑ «Síntomas de la acatisia» (en castellà). Arxivat de l'original el 2018-10-10. [Consulta: 6 abril 2015].

Vegeu també [modifica]

- Discinèsia

Registres d'autoritat	NKC (1)
Bases d'informació	Britannica (1)

Categoria: Signes i símptomes neurològics

El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual; es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les Condicions d'ús. Wikipedia® (Viquipèdia™) és una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc.

Captured by FireShot Pro: 16 octubre 2026, 16:59:23
https://getfireshot.com